

APPROXIMANTS DE PADÉ DES q -POLYLOGARITHMES

C. KRATTENTHALER[†] ET T. RIVOAL

Dédié à Wolfgang Schmidt, pour son soixante-dixième anniversaire

RÉSUMÉ. Nous résolvons un problème d'approximation simultanée de type Padé mettant en jeu des q -analogues spécifiques des polylogarithmes et des puissances du logarithme. Ce problème est fortement lié aux résultats récents des auteurs et de Wadim Zudilin [« Séries hypergéométriques basiques, fonction q -zêta et séries d'Eisenstein », à paraître au J. Inst. Math. Jussieu] sur la dimension de l'espace vectoriel engendré par des q -analogues des valeurs de la fonction zêta de Riemann aux nombres entiers. Nous montrons aussi que ce résultat peut être considéré comme q -analogue d'un résultat de Stéphane Fischler et du deuxième auteur [J. Math. Pures Appl. **82** (2003), 1369–1394].

ABSTRACT. We solve a Padé-type problem of approximating three specific functions simultaneously by q -analogues of polylogarithms, respectively by powers of the logarithm. This problem is intimately related to recent results of the authors and Wadim Zudilin [« Séries hypergéométriques basiques, fonction q -zêta et séries d'Eisenstein », J. Inst. Math. Jussieu (to appear)] on the dimension of the vector space generated by q -analogues of values of the Riemann zeta function at integers. We also show that our result can be considered as a q -analogue of a result of Stéphane Fischler and the second author [J. Math. Pures Appl. **82** (2003), 1369–1394].

1. INTRODUCTION

Considérons la série

$$\zeta_q(s) = \sum_{k=1}^{\infty} k^{s-1} \frac{q^k}{1 - q^k},$$

qui converge pour tout complexe $|q| < 1$ et tout entier $s \geq 1$. La notation ζ_q est justifiée par le fait que cette fonction est un q -analogue de la fonction zêta de Riemann $\zeta(s)$ au sens suivant (voir [5, paragraphe 4.1], [3, Theorem 2] ou [8]),

$$\lim_{q \rightarrow 1} (1 - q)^s \zeta_q(s) = (s - 1)! \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^s} = (s - 1)! \zeta(s).$$

2000 *Mathematics Subject Classification.* Primary 41A21; Secondary 33D15.

Key words and phrases. Approximants de Padé, q -analogue du logarithme, q -analogues des polylogarithmes, confluence.

[†] Recherche partiellement supportée par le Programme « Accroître le potentiel humain de recherche » de la Commission Européenne, contrat HPRN-CT-2001-00272, “Algebraic Combinatorics in Europe”.

Dans [5], les deux auteurs et W. Zudilin ont montré que la dimension de l'espace vectoriel engendré sur $\mathbb{Q}$ par $1, \zeta_q(3), \zeta_q(5), \dots, \zeta_q(A)$ ($A \geq 3$ impair) est minorée par $\frac{\pi + o(1)}{2\sqrt{\pi^2 + 12}} \sqrt{A}$ lorsque $1/q \in \mathbb{Z} \setminus \{\pm 1\}$. La démonstration utilise les fonctions q -polylogarithmes, définies pour tout entier $s \geq 1$, par

$$\text{Li}_s(z; q) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{q^k}{(1 - q^k)^s} z^k, \quad (1.1)$$

où z et q désignent des nombres complexes tels que $|q| < 1$ et $|zq| < 1$. Ces fonctions constituent des q -analogues des polylogarithmes usuels $\text{Li}_j(z)$ au sens suivant :

$$\lim_{q \rightarrow 1} (1 - q)^s \text{Li}_s(z; q) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{z^k}{k^s} = \text{Li}_s(z).$$

Notons que les polylogarithmes sont aussi utilisés au cours de la démonstration du théorème suivant (dont celui rappelé ci-dessus est un q -analogue) : la dimension de l'espace vectoriel engendré sur $\mathbb{Q}$ par $1, \zeta(3), \zeta(5), \dots, \zeta(A)$ ($A \geq 3$ impair) est minorée par $\frac{1 + o(1)}{1 + \log(2)} \log(A)$ (voir [2, 6]). Dans les deux cas, la démonstration est en fait basée sur une étude très fine d'une série (q -)hypergéométrique bien choisie que l'on commence par exprimer comme une combinaison linéaire polynomiale en les (q -)polylogarithmes. Plus précisément, soient A, n, r des entiers positifs tels que $0 \leq r \leq A/2$. Définissons les factorielles décalées (ou symboles de Pochhammer) $(\alpha)_m = \alpha(\alpha + 1) \cdots (\alpha + m - 1)$ et les factorielles q -décalées $(\alpha; q)_m = (1 - \alpha)(1 - \alpha q) \cdots (1 - \alpha q^{m-1})$, avec la convention usuelle que les produits vides pour $m = 0$ valent 1. On pose alors

$$S_n(z; q) = (q; q)_n^{A-2r} \sum_{k=1}^{\infty} q^k \frac{(q^{k-rn}; q)_{rn} (q^{k+n+1}; q)_{rn}}{(q^k; q)_{n+1}^A} q^{(k-1/2)(A-2r)n/2} z^{-k},$$

avec $|q| < 1 \leq |z|$ et A pair, ainsi que

$$S_n(z) = n!^{A-2r} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(k - rn)_{rn} (k + n + 1)_{rn}}{(k)_{n+1}^A} z^{-k},$$

avec $|z| \geq 1$. Il est alors facile de montrer l'existence de deux familles de polynômes $P_{j,n}(z; q) \in \mathbb{C}(q)[z]$ et $P_{j,n}(z) \in \mathbb{C}[z]$, de degré au plus n , tels que

$$S_n(z; q) = P_{0,n}(z; q) + \sum_{j=1}^A P_{j,n}(z; q) \text{Li}_j(1/z; q) \quad (1.2)$$

et

$$S_n(z) = P_{0,n}(z) + \sum_{j=1}^A P_{j,n}(z) \text{Li}_j(1/z). \quad (1.3)$$

Par ailleurs, les numérateurs des sommandes dans les définitions de $S_n(z; q)$ et $S_n(z)$ s'annulent pour les indices $k \in \{1, \dots, rn\}$, ce qui assure que l'ordre en $z = 0$ des deux séries

est exactement $rn + 1$: les équations (1.2) et (1.3) peuvent donc être vues comme des problèmes d'approximations de type Padé pour les séries entières 1 et $\text{Li}_j(z; q)$, respectivement 1 et $\text{Li}_j(z)$. L'information n'est cependant pas suffisante pour affirmer qu'il n'existe, à constante multiplicative près, qu'une seule fonction $S_n(z; q)$, resp. $S_n(z)$, vérifiant (1.2), resp. (1.3), et qui s'annule à l'ordre $rn + 1$.

Dans [4], sont énoncées des conditions supplémentaires, de type Padé, portant sur des objets liés à la série $S_n(z)$ et qui suffisent à assurer que $S_n(z)$ est bien la seule solution de (1.3) pour des polynômes $P_{j,n}(z)$ de degré au plus n . Voici l'énoncé précis.

Étant donnés des entiers $A \geq 1$, $n \geq 0$, $\rho \geq 0$, $\sigma \geq 0$ tels que $\rho + \sigma + 2 \leq A(n + 1)$, on cherche à résoudre le problème d'approximations simultanées de Padé suivant : déterminer des polynômes (dépendants de A , n , ρ , σ) $P_{0,n}(z)$, $\overline{P}_0(z)$ et $P_j(z)$ (pour $j = 1, \dots, A$), de degré au plus n et à coefficients dans $\mathbb{Q}$, tels que

$$\left\{ \begin{array}{l} S(z) = P_0(z) + \sum_{j=1}^A P_j(z) \text{Li}_j(1/z) = \mathcal{O}(z^{-\rho-1}) \quad \text{quand } z \rightarrow \infty; \\ \overline{S}(z) = \overline{P}_0(z; q) + \sum_{j=1}^A P_j(z) \text{Li}_j(z) = \mathcal{O}(z^{\sigma+n+1}) \quad \text{quand } z \rightarrow 0; \\ I(z) = \sum_{j=1}^A P_j(z) \frac{\log^{j-1}(1/z)}{(j-1)!} = \mathcal{O}((z-1)^{A(n+1)-\rho-\sigma-2}) \quad \text{quand } z \rightarrow 1. \end{array} \right. \quad (1.4)$$

(Ici et dans toute la suite, la fonction logarithme est définie avec sa branche principale : $\log(z) = \log|z| + i \arg(z)$, avec $-\pi < \arg(z) \leq \pi$. On notera $\mathbb{R}_-$ l'ensemble des réels négatifs.) On a alors le résultat suivant, qui résout complètement ce problème.

Théorème 1. *Dans les conditions ci-dessus, le problème (1.4) a une solution unique, à une constante multiplicative près. En choisissant cette constante égale à 1, on a*

$$S(z) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(k-\rho)_{\rho} (k+n+1)_{\sigma}}{(k)_{n+1}^A} z^{-k} \quad \text{et} \quad I(z) = \frac{1}{2i\pi} \int_{\mathcal{C}} \frac{(s-\rho)_{\rho} (s+n+1)_{\sigma}}{(s)_{n+1}^A} z^{-s} ds,$$

où $\mathcal{C}$ est n'importe quelle courbe fermée orientée dans le sens direct qui entoure les pôles de l'intégrande, i.e. $0, -1, \dots, -n$.

Le but de cette note est de prouver un q -analogue du théorème précédent. On suppose dorénavant que $q \notin \mathbb{R}_-$ ce qui permet de définir $\log_q(z) = \log(z)/\log(q)$.

Étant donnés des entiers $A \geq 1$, $n \geq 0$, $\rho \geq 0$, $\sigma \geq 0$ et $\nu \geq 0$ tels que $\rho + \sigma + \nu + 2 \leq A(n+1)$, on cherche à résoudre le problème d'approximations simultanées de Padé suivant :

déterminer des polynômes (dépendants de A, n, ρ, σ et ν) $P_0(z; q)$, $\overline{P}_0(z; q)$ et $P_j(z; q)$ (pour $j = 1, \dots, A$) en la variable z , de degré au plus n et à coefficients dans $\mathbb{Q}(q)$, tels que

$$\left\{ \begin{array}{l} S(z; q) = P_0(z; q) + \sum_{j=1}^A P_j(z; q) \operatorname{Li}_j(1/z; q) = \mathcal{O}(z^{-\rho-1}) \quad \text{quand } z \rightarrow \infty; \\ \overline{S}(z; q) = \overline{P}_0(z; q) + \sum_{j=1}^A P_j(z; q) \operatorname{Li}_j(z; 1/q) = \mathcal{O}(z^{\sigma+n+1}) \quad \text{quand } z \rightarrow 0; \\ I(z; q) = - \sum_{j=1}^A P_j(zq^{1-j}; q) \frac{(-\log_q(1/z))_{j-1}}{(j-1)!} = \mathcal{O}(z - q^{-\ell}) \quad \text{quand } z \rightarrow q^{-\ell} \\ \text{pour tout } \ell \in \{-\nu, -\nu+1, \dots, A(n+1) - \rho - \sigma - \nu - 2\}. \end{array} \right. \quad (1.5)$$

Théorème 2. Dans les conditions ci-dessus, le problème (1.5) a une solution unique, à une constante multiplicative près. En choisissant cette constante égale à 1, on a

$$S(z; q) = \sum_{k=1}^{\infty} q^k \frac{(q^{k-\rho}; q)_{\rho} (q^{k+n+1}; q)_{\sigma}}{(q^k; q)_{n+1}^A} q^{\nu k} z^{-k}$$

et

$$I(z; q) = \frac{1}{2i\pi} \int_{\mathcal{C}} \frac{(sq^{-\rho}; q)_{\rho} (sq^{n+1}; q)_{\sigma}}{(s; q)_{n+1}^A} s^{\nu - \log_q(z)} ds,$$

où $\mathcal{C}$ est n'importe quelle courbe fermée orientée dans le sens direct qui entoure les pôles de l'intégrande, i.e. $1, q^{-1}, \dots, q^{-n}$, sans traverser la coupure $\mathbb{R}_-$.

Avant de passer à la démonstration du Théorème 2, faisons quelques remarques :

Les Théorèmes 1 et 2 sont formellement très similaires, à ceci près que le paramètre « q -analogue » ν n'a pas d'équivalent dans le cas classique. La différence majeure se situe dans l'énoncé des conditions d'annulation des fonctions $I(z)$ et $I(z; q)$: cela n'a cependant rien de surprenant, puisqu'il est fréquent dans ce genre de situation que des singularités en certaines puissances de q confluent vers une unique singularité en 1 (avec une certaine multiplicité) lorsque $q \rightarrow 1$. Nous explicitons plus en détail la « convergence » du Théorème 2 vers le Théorème 1 au paragraphe 3.

Il est à noter l'utilisation, naturelle dans notre contexte, de $\log(z)/\log(q)$ comme q -analogue de la fonction logarithme. Cet analogue, qui possède donc une monodromie non-triviale en 0, est un choix historiquement classique : voir [1]. Certaines théories géométriques récentes (étudiant l'analogie entre équations aux q -différences et équations différentielles) ont mis en avant un q -analogue différent du logarithme : J. Sauloy [7] utilise comme q -logarithme la fonction $\ell_q(z) = z\theta'_q(z)/\theta_q(z)$, avec $\theta_q(z) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} (-1)^n q^{-n(n-1)/2} z^n$, qui est méromorphe sur $\mathbb{C}$ et dont les pôles confluent le long d'une spirale lorsque $q \rightarrow 1$, cette spirale agissant alors comme une coupure du plan pour le logarithme usuel.

2. DÉMONSTRATION DU THÉORÈME 2

Remarquons tout d'abord que les polynômes $P_0(z; q)$ et $\overline{P}_0(z; q)$ sont déterminés de façon unique, une fois connus les autres polynômes du problème (1.5). De plus, celui-ci se traduit par un système linéaire dont les inconnues sont les $A(n+1)$ coefficients des polynômes $P_j(z; q)$ ($j \geq 1$) et dont le nombre d'équations est $A(n+1) - 1$: il y a donc au moins une solution non-triviale (*i.e.* non identiquement nulle).

On utilise temporairement la notation $P_j(z; q)$ pour désigner des polynômes génériques de degré au plus n en z et à coefficients dans $\mathbb{Q}(q)$, sans présager qu'il s'agisse des solutions du problème (1.5). On pose

$$P_j(z; q) = \sum_{t=0}^n p_{j,t}(q) z^t, \quad (2.1)$$

où $p_{j,t}(q) \in \mathbb{Q}(q)$, de telle sorte que

$$\sum_{j=1}^A P_j(z; q) \operatorname{Li}_j(1/z; q) = \sum_{k=1-n}^{\infty} q^k z^{-k} \sum_{j=1}^A \sum_{t=\max(0, 1-k)}^n \frac{q^t p_{j,t}(q)}{(1 - q^{k+t})^j}.$$

Il est utile à ce point d'introduire la fraction rationnelle (qui dépend aussi de A) :

$$R(s; q) = \sum_{j=1}^A \sum_{t=0}^n \frac{q^t p_{j,t}(q)}{(1 - sq^t)^j} \quad (2.2)$$

$$= \frac{\Pi(s; q)}{(s; q)_{n+1}^A}, \quad (2.3)$$

où $\Pi(s; q)$ est un polynôme en s , à coefficients dans $\mathbb{Q}(q)$, et de degré $< A(n+1)$ puisque la décomposition en éléments simples (2.2) de $R(s; q)$ est sans partie principale. Il est clair que la connaissance de $\Pi(s; q)$ détermine *de facto* les polynômes $P_j(z; q)$ ($j \geq 1$). On en déduit que si l'on connaît $\Pi(s; q)$, alors on a

$$S(z; q) = \sum_{k=1}^{\infty} q^k R(q^k; q) z^{-k}$$

et aussi, par un simple calcul de résidus utilisant l'expression (2.2),

$$I(z; q) = \frac{1}{2i\pi} \int_{\mathcal{C}} R(s; q) s^{-\log_q(z)} ds,$$

où $\mathcal{C}$ est n'importe quelle courbe fermée entourant dans le sens direct les pôles de $R(z; q)$ et qui ne traverse pas la coupure $\mathbb{R}_-$. Nous allons maintenant montrer que la solution du problème de Padé (1.5) est unique, à une constante multiplicative près, et la déterminer en explicitant le polynôme « codant » $\Pi(s; q)$. Pour cela, nous interprétons chacune des conditions de (1.5) par quatre lemmes : il en découlera alors que

$$\Pi(s; q) = (sq^{-\rho}; q)_{\rho} (sq^{n+1}; q)_{\sigma} s^{\nu},$$

à une constante multiplicative près.

Lemme 1. Les polynômes $P_1, \dots, P_A$ vérifient la première condition de (1.5) si, et seulement si,

$$\prod_{i=1}^{\rho} (1 - sq^{-i}) = (sq^{-\rho}; q)_{\rho} \quad \text{divise} \quad \Pi(s; q).$$

Démonstration. La première condition de (1.5) se traduit par l'annulation des coefficients de Taylor de $S(z; q)$ d'indices $1, 2, \dots, \rho$, ce qui équivaut à l'annulation de la fonction $k \mapsto \Pi(q^k; q)$ en $k = 1, 2, \dots, \rho$. Cela équivaut en fait à l'annulation du polynôme $\Pi(s; q)$ en $s = q, q^2, \dots, q^{\rho}$, d'où l'assertion. $\square$

Lemme 2. Les polynômes $P_1, \dots, P_A$ vérifient la deuxième condition de (1.5) si, et seulement si,

$$\prod_{i=n+1}^{n+\sigma} (1 - sq^i) = (sq^{n+1}; q)_{\sigma} \quad \text{divise} \quad \Pi(s; q).$$

Démonstration. Dans la deuxième condition de (1.5), on change z en $1/z$, puis on multiplie par z^n , de telle sorte que $z^n \bar{S}(1/z; q) = \mathcal{O}(z^{-\sigma-1})$. On a

$$\begin{aligned} z^n \sum_{j=1}^A P_j(1/z; q) \operatorname{Li}_j(1/z; 1/q) &= \sum_{k=1-n}^{\infty} q^{-k} z^{-k} \sum_{j=1}^A \sum_{t=\max(0, 1-k)}^n \frac{q^{-t} p_{j, n-t}(q)}{(1 - q^{-k-t})^j} \\ &= q^{-n} \sum_{k=1-n}^{\infty} q^{-k} z^{-k} \sum_{j=1}^A \sum_{t=0}^{\min(n, n+k-1)} \frac{q^t p_{j, t}(q)}{(1 - q^{t-k-n})^j}. \end{aligned}$$

Pour $k \geq 1$, le coefficient de z^{-k} dans la série $z^n \bar{S}(1/z; q)$ est donc donné par $q^{-n-k} R(q^{-k-n}; q)$. L'annulation des coefficients de Taylor de $\bar{S}(z; q)$ d'indices $1, 2, \dots, \sigma$ équivaut donc à l'annulation du polynôme $\Pi(s; q)$ en $s = q^{-n-1}, \dots, q^{-n-\sigma}$, d'où l'assertion. $\square$

Lemme 3. La condition $I(q^{-j}; q) = 0$ pour $j \in \{-\nu, \dots, -1\}$ équivaut à s^{ν} divise $\Pi(s; q)$.

Démonstration. Rappelons que

$$I(z; q) = \frac{1}{2i\pi} \int_{\mathcal{C}} \frac{\Pi(s; q)}{(s; q)_{n+1}^A} s^{-\log_q(z)} ds.$$

où $\mathcal{C}$ est n'importe quelle courbe fermée orientée dans le sens direct et entourant les pôles de l'intégrande, i.e. $1, q^{-1}, \dots, q^{-n}$, sans traverser la coupure $\mathbb{R}_-$.

Soit $-n \leq j \leq -1$, et supposons que $I(q^{-j}, q) = 0$. Alors, pour tout contour $\mathcal{C}$ entourant les points $1, q^{-1}, \dots, q^{-n}$ mais ne traversant pas la coupure, donc n'entourant pas 0, on a

$$0 = I(q^{-j}; q) = \frac{1}{2i\pi} \int_{\mathcal{C}} \frac{\Pi(s; q)}{s^{-j} (s; q)_{n+1}^A} ds,$$

où l'intégrande est une fraction rationnelle dont 0 est peut-être un pôle : nous allons montrer que ce n'est (éventuellement) le cas que si $j < -\nu$, ce qui prouvera que s^{ν} divise $\Pi(s; q)$.

Pour cela, notons que, par le théorème des résidus et parce que le résidu à l'infini de l'intégrande $F(s; q)$ de $I(q^{-j}; q)$ est nul (car le degré du numérateur de $F(s; q)$ est $\leq A(n+1) - 1$, et celui de son dénominateur $\geq A(n+1) + 1$), on a

$$\begin{aligned} 0 = -\text{Res}_\infty(F) &= \frac{1}{2i\pi} \int_{\mathcal{C}'} F(s; q) \, ds \\ &= \frac{1}{2i\pi} \int_{\mathcal{C}} F(s; q) \, ds + \frac{1}{2i\pi} \int_{\mathcal{C}_0} F(s; q) \, ds = \frac{1}{2i\pi} \int_{\mathcal{C}_0} F(s; q) \, ds, \end{aligned}$$

où $\mathcal{C}'$ est un cercle entourant tous les pôles de F ainsi que 0, et $\mathcal{C}_0$ un cercle entourant 0 et aucun autre pôle de F , les deux orientés dans le sens direct. Donc

$$0 = \frac{1}{2i\pi} \int_{\mathcal{C}_0} F(s; q) \, ds = \frac{1}{(-j-1)!} \left((s; q)_{n+1}^{-A} \Pi(s; q) \right)^{(-j-1)} \Big|_{s=0}. \quad (2.4)$$

Puisque la fonction $s \mapsto (s; q)_{n+1}^{-A}$ ne s'annule pas en $s = 0$, on déduit de (2.4), par récurrence sur $j \in \{-1, -2, \dots, -\nu\}$, que $0 = \Pi(0; q) = \Pi^{(1)}(0; q) = \dots = \Pi^{(\nu-1)}(0; q)$, ce qui prouve que s^ν divise $\Pi(s; q)$. La réciproque se montre facilement en renversant cet argument. $\square$

Lemme 4. *La condition $I(q^{-j}; q) = 0$ pour $j \in \{0, \dots, A(n+1) - \rho - \sigma - \nu - 2\}$ équivaut à*

$$\deg(\Pi) \leq \rho + \sigma + \nu.$$

Démonstration. Développons $\Pi(s; q)/(s; q)_{n+1}^A$ en série entière en $s = \infty$:

$$\frac{\Pi(s; q)}{(s; q)_{n+1}^A} = \sum_{k=\omega}^{\infty} \frac{c_k}{s^k}$$

où $\omega = A(n+1) - \deg(\Pi)$ est l'ordre de cette fraction rationnelle à l'infini, et les c_k sont des nombres complexes. Notons que cette série converge au moins pour $|s|$ assez grand puisque $\omega \geq 1$, disons pour $|s| \geq S$. On choisit alors un cercle suffisamment grand pour que l'on puisse intégrer cette série terme à terme, disons le cercle $\overline{\mathcal{C}} = \{z : |z| = S + 1\}$. On a alors

$$I(q^{-j}; q) = \frac{1}{2i\pi} \int_{\overline{\mathcal{C}}} \frac{\Pi(s; q)}{(s; q)_{n+1}^A} s^j \, ds = \sum_{k=\omega}^{\infty} c_k \int_{\overline{\mathcal{C}}} s^{j-k} \, ds = c_{j+1}.$$

L'annulation de $I(q^{-j}; q)$ pour $j \in \{0, \dots, A(n+1) - \rho - \sigma - \nu - 2\}$ équivaut donc à

$$\omega \geq A(n+1) - \rho - \sigma - \nu,$$

ce qui équivaut plus simplement à $\deg(\Pi) \leq \rho + \sigma + \nu$. $\square$

Démonstration du Théorème 2. Puisque les polynômes s^ν , $(sq^{-\rho}; q)_\rho$ et $(sq^{n+1}; q)_\sigma$ n'ont pas de racines communes, les trois premiers lemmes montrent que $s^\nu (sq^{-\rho}; q)_\rho (sq^{n+1}; q)_\sigma$ divise $\Pi(s; q)$. Or le dernier lemme montre que $\deg(\Pi) \leq \rho + \sigma + \nu$, ce qui achève la démonstration. $\square$

3. CONFLUENCE DU THÉORÈME 2 VERS LE THÉORÈME 1

Dans ce paragraphe, nous explicitons le sens précis en lequel le Théorème 2 « tend » vers le Théorème 1.

Pour commencer, on remarque que, évidemment, on a

$$\lim_{q \rightarrow 1} (1 - q)^{A(n+1) - \sigma - \rho} S(z; q) = S(z) \quad \text{et} \quad \lim_{q \rightarrow 1} (1 - q)^{A(n+1) - \sigma - \rho} \overline{S}(z; q) = \overline{S}(z).$$

De plus, en faisant la substitution $s \rightarrow q^t$ dans l'intégrale définissant $I(z; q)$, on voit que

$$\lim_{q \rightarrow 1} (1 - q)^{A(n+1) - \sigma - \rho - 1} I(z; q) = -I(q).$$

D'autre part, la définition (2.1) des polynômes $P_j(z; q)$ est donnée par leurs coefficients $p_{j,t}(q)$ qui figurent dans (2.2), avec $\Pi(s; q) = (sq^{-\rho}; q)_\rho (sq^{n+1}; q)_\sigma s^\nu$. Explicitement, les $p_{j,t}(q)$ sont donnés par

$$p_{j,t}(q) = \frac{(-1)^{A-j} q^{t(A-j-1)}}{(A-j)!} \frac{\partial^{A-j}}{\partial s^{A-j}} \left(\frac{(1 - sq^t)^A \Pi(s; q)}{(s; q)_{n+1}^A} \right) \Big|_{s=1}.$$

Par conséquent, $p_{j,t}(q)$ est une fraction rationnelle en q ; si cette fraction rationnelle est écrite sous forme réduite, la plus grande puissance de $1 - q$ qui divise le dénominateur est $(1 - q)^{A(n+1) - \sigma - \rho - j}$. En particulier, la limite $\lim_{q \rightarrow 1} (1 - q)^{A(n+1) - \sigma - \rho - j} P_j(z; q)$ existe : c'est un polynôme en z , que l'on notera $Q_j(z)$. De façon similaire, la limite $\lim_{q \rightarrow 1} (1 - q)^{A(n+1) - \sigma - \rho} \overline{P}_0(z; q)$ existe et sera notée $\overline{Q}_0(z)$.

Si l'on combine ces remarques avec (1.1) et le fait que

$$\lim_{q \rightarrow 1} (1 - q) \log_q(z) = -\log(z),$$

on en déduit que, en multipliant les deux premières conditions dans (1.5) par $(1 - q)^{A(n+1) - \sigma - \rho}$, en multipliant la troisième par $(1 - q)^{A(n+1) - \sigma - \rho - 1}$, puis en faisant finalement tendre q vers 1, on obtient

$$\begin{cases} S(z) = Q_0(z) + \sum_{j=1}^A Q_j(z) \operatorname{Li}_j(1/z) = \mathcal{O}(z^{-\rho-1}) & \text{quand } z \rightarrow \infty; \\ \overline{S}(z) = \overline{Q}_0(z) + \sum_{j=1}^A Q_j(z) \operatorname{Li}_j(z) = \mathcal{O}(z^{\sigma+n+1}) & \text{quand } z \rightarrow 0; \\ I(z) = \sum_{j=1}^A Q_j(z) \frac{\log^{j-1}(1/z)}{(j-1)!} = \mathcal{O}(?) & \text{quand } z \rightarrow 1. \end{cases} \quad (3.1)$$

Il nous reste à montrer que l'on peut mettre $\mathcal{O}((z-1)^{A(n+1) - \rho - \sigma - 2})$ à la place de $\mathcal{O}(?)$. Pour le faire, supposons donnée une fonction $f(z; q)$ analytique en z dans un voisinage ouvert suffisamment grand de 1, et telle que

$$f(z; q) = \mathcal{O}(z - q^{-\ell}) \quad \text{quand } z \rightarrow q^{-\ell} \quad (3.2)$$

pour tout $\ell \in \{-m, -m+1, \dots, p\}$. Pour simplifier, on considère le cas où $p = 0$, car l'argument qui va suivre se généralise sans difficulté au cas où p est quelconque. On développe tout d'abord $f(z; q)$ en série de Taylor autour de $z = 1$:

$$f(z; q) = \sum_{k=1}^{\infty} f_k(q)(z-1)^k, \quad (3.3)$$

ce développement ne contenant pas de terme constant à cause de la condition (3.2) pour $\ell = 0$. Nous supposons alors une condition supplémentaire : la limite $\lim_{q \rightarrow 1} f_k(q)$ existe pour tout k et

$$\lim_{q \rightarrow 1} \sum_{k=1}^{\infty} f_k(q)(z-1)^k = \sum_{k=1}^{\infty} \lim_{q \rightarrow 1} f_k(q)(z-1)^k.$$

Cette condition est satisfaite dans notre cas, c'est-à-dire pour

$$f(z; q) = -(1-q)^{A(n+1)-\sigma-\rho-1} \sum_{j=1}^A P_j(zq^{1-j}; q) \frac{(-\log_q(1/z))_{j-1}}{(j-1)!}. \quad (3.4)$$

La condition (3.2) pour les valeurs non-nulles de ℓ implique le système d'équations

$$0 = f(q^{-\ell}; q) = \sum_{k=1}^{\infty} f_k(q)(q^{-\ell} - 1)^k, \quad \ell \in \{-m, -m+1, \dots, -1\}. \quad (3.5)$$

On multiplie la ℓ -ième équation par

$$c_\ell = \frac{1}{(q^{-\ell} - 1) \prod_{\substack{h=1 \\ h \neq -\ell}}^m (q^{-\ell} - q^h)}$$

et en faisant la somme de ces équations multipliées par le facteur c_ℓ correspondant sur $\ell \in \{-m, -m+1, \dots, -1\}$, on obtient

$$\begin{aligned} 0 &= \sum_{\ell=-m}^{-1} c_\ell f(q^{-\ell}; q) \\ &= \sum_{\ell=-m}^{-1} c_\ell \sum_{k=1}^{\infty} f_k(q)(q^{-\ell} - 1)^k \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} f_k(q) \sum_{\ell=-m}^{-1} c_\ell (q^{-\ell} - 1)^k. \end{aligned} \quad (3.6)$$

À ce point, on note que le choix des coefficients c_ℓ implique que les coefficients de $f_k(q)$ dans la somme (3.6) sont nuls pour $k = 1, 2, \dots, m-1$, et que le coefficient de $f_m(q)$ est

exactement 1. Dans le résultat

$$0 = f_m(q) + \sum_{k \geq m+1}^{\infty} f_k(q) \sum_{\ell=-m}^{-1} \frac{(q^{-\ell} - 1)^k}{(q^{-\ell} - 1) \prod_{\substack{h=1 \\ h \neq -\ell}}^m (q^{-\ell} - q^h)},$$

on fait maintenant tendre q vers 1 : comme la somme extérieure porte sur les $k > m$, la limite du sommande de la somme intérieure est toujours zéro. Par conséquent, on obtient bien que $f_m(1) = 0$. De plus, si l'on applique le même argument pour $\ell \in \{-\bar{m}, -\bar{m} + 1, \dots, -1\}$ avec $\bar{m} = m - 1, m - 2, \dots, 1$, alors on obtient que $f_{\bar{m}}(1) = 0$ pour tout $\bar{m} \in \{1, 2, \dots, m\}$, ce qui prouve que

$$f(z; 1) = \mathcal{O}((z - 1)^m).$$

Cet argument, appliqué à (3.4), montre que l'on peut bien remplacer $\mathcal{O}(?)$ dans (3.1) par $\mathcal{O}((z - 1)^{A(n+1)-\rho-\sigma-2})$, comme annoncé. Le problème d'approximation (3.1) est donc exactement le problème (1.4). Comme il est démontré dans [4] que ce problème a une solution unique, on a forcément l'égalité $Q_j(z) = P_j(z)$ pour tout j .

BIBLIOGRAPHIE

- [1] C. R. Adams, *On the linear ordinary q -difference equations*, Ann. Math. **30** (1929), no. 2, 195–205.
- [2] K. Ball et T. Rivoal, *Irrationalité d'une infinité de valeurs de la fonction zêta aux entiers impairs*, Invent. Math. **146** (2001), no. 1, 193–207.
- [3] M. Kaneko, N. Kurokawa et M. Wakayama, *A variation of Euler's approach to values of the Riemann zeta function*, Kyushu J. Math. **57.1** (2003), 175–192. <http://arXiv.org/abs/math.QA/0206171>.
- [4] S. Fischler et T. Rivoal, *Approximants de Padé et séries hypergéométriques équilibrées*, J. Math. Pures Appl. **82** (2003), no. 10, 1369–1394.
- [5] C. Krattenthaler, T. Rivoal et W. Zudilin, *Séries hypergéométriques basiques, fonction q -zêta et séries d'Eisenstein*, Prépublication (2003), à paraître au Journal de l'Institut de Mathématiques de Jussieu. Disponible sous <http://arXiv.org/abs/math.NT/0311033>.
- [6] T. Rivoal, *La fonction Zêta de Riemann prend une infinité de valeurs irrationnelles aux entiers impairs*, C. R. Acad. Sci. Paris, Série I Math. **331** (2000), no. 4, 267–270. Disponible sous <http://arXiv.org/abs/math.NT/0008051>.
- [7] J. Sauloy, *Systèmes aux q -différences singuliers réguliers : classification, matrice de connexion et monodromie*, Ann. Inst. Fourier Grenoble **50** (2000), no. 4, 1021–1071.
- [8] W. Zudilin, *Diophantine problems for q -zeta values*, (en russe) Mat. Zametki **72.6** (2002), 936–940; trad. en anglais dans Math. Notes **72.6** (2002), 858–862. <http://arXiv.org/abs/math.NT/0206179>.

INSTITUT GIRARD DESARGUES, UNIVERSITÉ CLAUDE BERNARD LYON-I, 21, AVENUE CLAUDE BERNARD, F-69622 VILLEURBANNE CEDEX, FRANCE
E-mail address: kratt@euler.univ-lyon1.fr

LABORATOIRE DE MATHÉMATIQUES NICOLAS ORESME, CNRS UMR 6139, UNIVERSITÉ DE CAEN, BP 5186, 14032 CAEN CEDEX, FRANCE
E-mail address: rivoal@math.unicaen.fr